

تعریف

تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد که از حیواناتی مانند گاو ، گوسفند ، سگ و خوک به انسان منتقل می گردد.

علائم و نشانه های وجود بیماری در انسان

بیماری با تب و لرز و تعریق ناگهانی شروع شده و بیمار از خستگی ، سستی ، درد سر ، درد عضلانی و کوفتگی بدن شکایت میکند .
این علائم معمولاً بین ۱ تا ۳ هفته و گاهی اوقات ۶ تا ۱۷ ماه بعد از ورود میکروب به بدن آشکار میشود.

علائم شایع بیماری در دام

۱- سقط جنین ۲- کاهش شیر ۳- کاهش وزن



راه های انتقال بیماری در انسان

- ۱- مصرف لبنیات آلوده مانند؛ آغوز (فله) ، شیر نجوشیده و کلیه محصولات تهیه شده از آن خصوصاً پنیر محلی
- ۲- تماس زخم باز، با ترشحات و بافت های آلوده و هنگام دوشیدن شیر
- ۳- استنشاق ذرات گرد و غبار در محیط های آلوده
- ۴- تماس با جنین سقط شده و استشمام بوی بد آن
- ۵- مصرف گوشت دام آلوده به صورت نپخته



پیشگیری در انسان

- ۱- مصرف نکردن فله و پنیر محلی ، سر شیر و خامه و سایر محصولات دامی غیرپاستوریزه
- ۲- استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش ، ماسک ، عینک و روپوش که لازم است در هنگام دوشیدن شیر و ذبح دام و رفتن به آغل و جمع آوری جنین سقط شده استفاده شود.
- ۳- عدم مصرف جگر خام و گوشت نپخته دام
- ۴- دفن بهداشتی جنین سقط شده به همراه آب آهک و با داشتن وسایل حفاظتی
- ۵- عدم نگهداری دام در محل سکونت و دور نگهداشتن حیوانات از محل زندگی انسان
- ۶- عدم ذبح دام به صورت غیر بهداشتی
- ۷- عدم خریداری دامهای آلوده غیر مجاز
- ۸- جدا نمودن دامهای سقط کرده از سایر دام ها

نکته:

شیر در صورتیکه بعد از به جوش آمدن مدت ۱۰ دقیقه بجوشد مصرف آن هیچ مشکلی ندارد و کلیه محصولات تهیه شده از آن نیز سالم خواهد بود.



شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان
معاونت امور بهداشتی
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها



در مورد بیماری

تب مالت

چه میدانیم؟

طرح و اجرا: حسین رزم آرا

● توجه

با در نظر گرفتن وضعیت موجود و شیوع بالای تب مالت در منطقه، همچنین عدم امکان واکسیناسیون وسیع دامها و کشتار دامهای آلوده، تنها راه کار موجود برای پیشگیری از بروز و انتقال بیماری رعایت نکات بهداشتی ذکر شده می باشد.

● نکات مهم

- ۱- شیوع بیماری در فصل بهار و پاییز، همزمان با جفتگیری و شیردهی گوسفندان افزایش می یابد.
- ۲- با دیدن سقط جنین در دامها باید به بیماری تب مالت فکر کرد.
- ۳- حدود ۹۰ درصد آلودگی انسان به تب مالت مربوط به تب مالت نوع گوسفندی می باشد.
- ۴- در صورت مشاهده بیماری در دامها با شبکه دامپزشکی مشورت نمائید.

شماره ستاد پیگیری بیماری ها در شبکه بهداشت:

۵۶۵۲۲۶۸۸

بهداشت فردی و بهسازی محیط

- ۱- در صورت ورود مواد عفونی به چشم با آب جاری و قطره چشمی کلرامفنیکل یا تتراسایکلین شستشو داده شود.
- ۲- از تماس کودکان با عامل عفونت جلوگیری بعمل آید، چرا که بیماری در کودکان شدت بیشتری دارد.
- ۳- لباس فرد در تماس باید بعد از کار، با جوشاندن، اتوکردن، یا شستن لباس با صابون یا وایتکس ضد عفونی گردد.
- ۴- جنین و جفت سقط شده باید ترجیحاً با سوزاندن از بین بروند و محلی که سقط یا زایمان عفونی در آن رخ داده است باید توسط آب آهک ضد عفونی گردد.
- ۵- فضولات حیوانی برای مدت طولانی عفونی باقی میماند، خصوصاً در دماهای پایین، لذا باید مواد آلوده را هر چند وقت یکبار جمع آوری و به مدت ۶ ماه در مکانی دور از محیط زندگی نگهداری کرد، تا با تجزیه طبیعی سالم سازی شود.